

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации докторанта PhD кафедры хирургических болезней №2 имени академика Усманова Н.У. ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино» Хамидова Фаридуна Маъруфовича на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц мужского пола», на соискание ученой степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D110117 – Хирургия.

Ежегодно в мире выполняется около 20 миллионов грыжесечений, что свидетельствует о том, что нозология остаётся одним из распространённых абдоминальных хирургических патологий, находясь на третьем месте уступа по числу аппендектомии и холецистэктомии.

Паховые грыжи наиболее часто встречаемая патология грыж передней брюшной стенки, частота которых варьирует от 50,7 до 80% случаев. Независимо от применения самых современных методов диагностики и имеющихся множества методов хирургического лечения паховых грыж, многие аспекты данной патологии остаются нерешёнными, а результаты их лечения на сегодняшний день остаются малоутешительными, вследствие высокой частоты послеоперационных осложнений.

По данным литературных источников более половины заболеваний органов репродуктивной системы у детей, ранее перенесённых традиционные паховое грыжесечение могут быть в будущем причиной бездетности, к которым также относятся и паховая грыжа. При этом невыполненная оперативное вмешательство также может привести к увеличению температуры данной области приводя к тепловым и механическим изменениям трофики яичка, именуемым в литературе термином «тепловой кастрации».


В последние годы встречаются множество научных работ, направленные на изучение причин различных осложнений в зависимости от способов коррекции. Продолжаются поиски путей миниинвазивного лечения паховых грыж как у взрослого контингента, так и у детей с целью профилактики ятрогенного повреждения элементов семенного канатика. В литературных источниках утверждается, что при традиционных методах оперативного лечения сохраняется риск повреждения семенного канатика и яичковой артерии

и связанной с ней атрофии яичка, вен гроздевидного сплетения с развитием орхита и более грозных осложнений при выделении грыжевого мешка и этапах пластики.

Таким образом, представленные на автореферате данные свидетельствуют о том, что в работе применены современные лечебно-диагностические технологии и были достигнуты успехи как в научном, так и в практическом плане улучшающие хирургическое лечение первичных, рецидивных паховых грыж и сочетания их с крипторхизмом.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Хамидова Ф.М. на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц мужского пола», является научно-квалифицированной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научные достижения в развитии науки. По своей научной новизне, практической значимости, по объёму выполненных исследований и методическому подходу диссертационная работа полностью соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267 (с изменениями и дополнениями от 26.06.23 №295), предъявляемым к диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D 110117 – Хирургия.

Рецензент: Заведующий кафедры
хирургии №2 ТНУ, к.м.н., доцент



Юлдошов М. А.

Подпись Юлдошова М.А. заверяю

Начальник УК ИСЧ ТНУ



Шодихонзода Э.Ш.

Адрес: 734035, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17

Тел: + (992 - 37) 221 - 77 - 11, 221-74-22

E-mail.ru: tnu.int.re@gmail.com

Сайт: <http://www.tnu.tj>

«19» марта 2026г.

Адрес: 734035, Республика Таджикистан, г. Душанбе

Тел.: (+992) 918 80 62 86

E-mail: murodali73@mail.ru