

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**диссертационного совета 6D.KOA-040 при ГОУ «Таджикский
государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»**

**на соискание учёной степени кандидата наук (постановление
Правительства РТ от 26.06.2023 г. №295)**

Аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 22.09.2026 г., №38
о присуждении Сафарзода Имрону Сафару, гражданину Республики
Таджикистан, учёной степени кандидата медицинских наук.

Диссертация на тему: «Влияние паховых грыж и их хирургических методов
коррекции на нарушение тестикулярной функции яичек» по специальности
3.1.17. Хирургия принята к защите 03.07.2026 года (протокол № 30)
диссертационным советом 6D.KOA-040 на базе ГОУ «Таджикский
государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» (734026, г.
Душанбе, ул. Сино 29-31), утверждённым распоряжением ВАК при Президенте
Республики Таджикистан №118 от 08.04.2022 г. (с внесением изменений и
дополнений от 25.04.2025, № 166).

Соискатель учёной степени Сафарзода Имрон Сафар, 1991 года рождения. В
2015 году соискатель учёной степени окончил ГОУ «Таджикский
государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» по
специальности «Лечебное дело». С 2015 по 2016 годы прошёл интернатуру по
специальности «Хирургия» в ГОУ «Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино».

Работает в должности заместителя директора по лечебной части и
диагностике ГУ «Комплекс здоровья Истиклол».

Диссертация выполнена на базе кафедры общей хирургии №2 ГОУ «ТГМУ
им. Абуали ибн Сино» Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии №2 ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Абдуллозода Джамолиддин Абдулло.

Официальные оппоненты:

1. Кодиров Фарход Давронжонович - доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения хирургии желудка и кишечника ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан» (г. Душанбе).

2. Бокиев Фатхулло Бахшуллоевич - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения бариатрической хирургии и герниологии ГУ «Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии» (г. Душанбе), дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» (г. Душанбе), в своём положительном заключении, подписанном экспертом д.м.н., заведующим кафедры хирургии Расуловым Н.А, указала, что диссертационная работа Сафарзода И.С. является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной задачи, имеющей весомое научное и практическое значение для хирургии, практической медицины в целом, и полностью соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 и 35 «Порядок присуждения учёных степеней», утверждённого Постановлением Правительства РТ от 30 июня 2021 года, №267 (с внесением изменений и дополнений от 26 июня 2023 года, №295), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Хирургия, а сам автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, общим объёмом 3,2 печатных листов, авторский вклад - 80%.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Гадоев И.С. Значение оксидантного эндотоксикоза и гипоксии в патогенезе тестикулярной недостаточности у больных паховыми грыжами [Текст] / Дж.А. Абдуллозода, М.Х. Набиев, И.С. Гадоев // Здоровоохранение Таджикистана. - 2022. - №3 (354). - С. 5–12.

2. Гадоев И.С. Влияние герниопластики на функциональное состояние яичек и сперматогенез у пациентов мужского пола при паховых грыжах [Текст] / М.Х. Набиев, Х.Х. Баротов, И.С. Гадоев // Авҷи Зухал. - 2023. - №1. - С. 139–148.

3. Сафарзода И.С. Результаты различных методов герниопластики при паховой грыже у мужчин репродуктивного возраста [Текст] / Дж.А. Абдуллозода, И.С. Сафарзода, К.Р. Рузибойзода // Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана. - 2024. - Т. 14, №3. - С. 3–15.

4. Сафарзода И.С. Состояние кровотока в сосудах семенного канатика у мужчин с паховой грыжей: клинико-ультразвуковое исследование и коррекция тестикулярной дисфункции [Текст] // Здоровоохранение Таджикистана. - 2025. - №3 (366). - С. 67–76.

На автореферат диссертации поступили 2 положительных отзыва от:

1. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой общей хирургии №1 имени профессора А.Н. Кахарова ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» Даминовой Н.М. – замечаний нет;

2. Доктора медицинских наук, профессора кафедры хирургии №1 Таджикского национального университета Азиззода З.А. – замечаний нет;

В отзывах отмечается актуальность темы, научная новизна и практическая значимость проведённых исследований. Также указывается, что диссертационная работа Сафарзода Имрон Сафар представляет собой

законченное, практически значимое исследование, соответствует специальности 3.1.17. Хирургия, а её автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата медицинских наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что они известны своими достижениями в области хирургии, научными работами в данных областях и имеют научные публикации по данной тематике, в связи с чем могут дать объективную оценку диссертационной работе по её актуальности, теоретической значимости и практической ценности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны способы интраоперационного определения кровотока в семенном канатике и яичке, атравматичного выделения грыжевого мешка и профилактики послеоперационной тестикулярной дисфункции, оформленные тремя рационализаторскими предложениями;

предложена комплексная оценка репродуктивного статуса мужчин с паховыми грыжами и дифференцированный выбор способа герниопластики с учётом длительности грыженосительства, размеров грыжи, сочетания с варикоцеле и состояния кровотока в яичке;

доказана на исследованном материале связь выраженных нарушений тестикулярного кровообращения с повышением маркеров локального оксидативного стресса и гипоксии. Суммарная частота ранних осложнений различалась между группами натяжной, открытой ненатяжной и видеолaparоскопической герниопластики: 37,5%, 18,2% и 11,1% соответственно ($p=0,036$);

внедрены приёмы щадящего выделения элементов семенного канатика и интраоперационного ультразвукового контроля кровоснабжения яичка на

клинических базах исследования; материалы работы используются в учебном процессе кафедры общей хирургии №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана значимость локального нарушения кровообращения, гипоксии и оксидативного стресса в формировании тестикулярной недостаточности. Сопоставление периферической и оттекающей от яичка венозной крови позволило уточнить локальный характер биохимических изменений при паховой грыже и её сочетании с варикоцеле.

Применительно к проблематике диссертации результативно

использованы клинико-anamnestическое обследование, ультразвуковое исследование и доплерография сосудов семенного канатика и яичка, анализ спермограммы, гормонального профиля, маркеров оксидативного стресса, гипоксии и воспаления;

изложены особенности обследования мужчин репродуктивного возраста при различных формах паховой грыжи, технические приёмы герниопластики и методы защиты элементов семенного канатика от операционной травмы;

раскрыты связи длительного грыженосительства, пахово-мошоночной формы грыжи, сопутствующего варикоцеле и перенесённых послеоперационных осложнений с нарушениями гемодинамики яичка и показателей репродуктивной функции;

изучены 120 мужчин 18–45 лет проспективной группы и 40 ранее оперированных пациентов ретроспективного этапа. В проспективной группе натяжная пластика выполнена 80 больным, открытая ненатяжная - 22, видеолапароскопическая - 18. Отдалённые результаты прослежены у 92 пациентов в сроки от одного года до пяти лет;

проведена модернизация приёмов выделения грыжевого мешка с

использованием оптического увеличения и дополнена интраоперационная оценка кровотока в семенном канатике и яичке.

Значение полученных соискателем учёной степени результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены способы профилактики повреждения элементов семенного канатика, контроля тестикулярного кровотока и послеоперационного наблюдения на базах ГУ «Комплекс здоровья “Истиклол”» и ГУ «Городской центр скорой медицинской помощи» г. Душанбе;

определены признаки повышенного риска репродуктивных нарушений, требующие расширенного обследования органов мошонки до операции и индивидуального выбора наименее травматичного способа герниопластики;

созданы практические рекомендации, по предоперационной оценке, тестикулярной функции, падающей технике выделения грыжевого мешка и раннему выявлению раневых осложнений с использованием динамического УЗИ и маркеров воспаления;

представлен комплекс технических решений. Предложенные лекарственные схемы антиоксидантной и антигипоксической поддержки требуют дальнейшего подтверждения эффективности в специально спланированных исследованиях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

теория построена на анализе клинических, инструментальных и лабораторных данных проспективного и ретроспективного этапов наблюдательного нерандомизированного исследования. Достоверность результатов оценена с учётом объёма и неоднородности сравниваемых групп;

идея базируется на данных литературы о функциональных последствиях паховой герниопластики и роли ишемии, гипоксии и оксидативного стресса в

повреждении яичка. Результаты разных способов хирургического лечения сопоставлены в пределах исследованной выборки;

использованы первичная медицинская документация, клинические наблюдения, данные УЗИ и доплерографии, спермологические, гормональные и биохимические показатели, а также результаты раннего и отдалённого наблюдения;

установлена статистическая значимость различий по суммарной частоте ранних осложнений ($p=0,036$). Различия по отдалённым рецидивам, репродуктивным нарушениям и пахово-генитальной невралгии статистической значимости не достигли и рассматриваются как тенденции;


использована статистическая обработка в программе Statistica 10.0: непараметрические критерии Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса и Вилкоксона, критерии для сравнения частот и поправки на множественные сравнения. Порог статистической значимости принят равным $p<0,05$. Наблюдательный дизайн ограничивает причинную интерпретацию различий между способами лечения.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельно выбранном научном направлении. Автор самостоятельно проанализировал современную литературу по проблеме исследования. Диссертант курировал больных в течение всего времени наблюдения, участвовал в проведении инструментальных методов исследования и различных способов хирургического лечения, готовил статьи к печати. При участии автора было оперировано большинство больных, включённых в исследование.


На заседании 22 сентября 2026 года диссертационный совет принял решение присудить Сафарзода Имрону Сафару учёную степень кандидата медицинских наук по специальности 3.1.17. Хирургия.

При проведении тайного голосования диссертационный совет состоял в количестве 11 человек, из них 3 доктора медицинских наук по специальности 3.1.17. Хирургия. Участвовавших в заседании из 11 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет.

**Председатель диссертационного совета,
доктор медицинских наук, профессор**

 **Гоибзода А.Дж.**

**Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат медицинских наук, доцент**

 **Али-Заде С.Г.**

22.09.2026 г.