

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации докторанта PhD кафедры хирургических болезней №2 имени академика Усманова Н.У. ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино» Худойдодова Оятулло Махмадуллоевича на тему «Оптимизация хирургической тактики грыж передней брюшной стенки», на соискание ученой степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D110117 – Хирургия.

Ежегодно в мире выполняется около 20 миллионов грыжесечений, что свидетельствует о том, что нозология остаётся одной из распространённых абдоминальных хирургических патологий, находясь на третьем месте, уступая по числу аппендектомии и холецистэктомии.

В литературе последних десятилетий изложено, что имеется множество факторов, которые способствуют развитию различных осложнений в послеоперационном периоде и рецидиву патологии. Неадекватная предоперационная подготовка, особенно при больших послеоперационных и рецидивных грыжах, а также гигантских грыжах являются определяющими факторами, которые могут способствовать развитию осложнений и рецидива патологии. Немаловажное значение имеет выбор метода операции в профилактике развития рецидива и осложнений в послеоперационном периоде. Так, анализ ряда работ показывает, что выполнение традиционных местно-пластических методов операции при первичных и грыжах небольших размеров, порою способствуют развитию рецидива патологии. Использование этих методик при грыжах больших размеров, послеоперационных и рецидивных является тактической ошибкой, способствующей развитию ряда осложнений. Ограниченная возможность ненатяжных методов ликвидации грыж, вернее игнорирование современных методов пластики, являются основными факторами развития ряда послеоперационных осложнений и рецидива патологии.

В последние годы продолжается дискуссия относительно факторов возникновения грыж передней брюшной стенки и при этом разделилось и мнение многих исследователей. Многие авторы в своих работах сообщают о

роли дисплазии соединительной ткани в развитии грыж передней брюшной стенки. Авторы утверждают, что нарушение соотношения коллагенов негативно влияя на соединительные ткани, участвуют в репаративных процессах области послеоперационной раны и, тем самым, способствуют развитию рецидива грыжи».

Таким образом, представленные в автореферате данные свидетельствуют о том, что в работе применены современные лечебно-диагностических технологии и были достигнуты успехи, как в научном, так и в практическом плане, улучшающие хирургическое лечение первичных, рецидивных и послеоперационных грыж передней брюшной стенки.

В заключении следует отметить, что диссертационная работа Худойдодова О.М. на тему «Оптимизация хирургической тактики грыж передней брюшной стенки», является научно-квалифицированной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научные достижения в развитии науки. По своей научной новизне, практической значимости, по объёму выполненных исследований и методическому подходу диссертационная работа полностью соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267 (с изменениями и дополнениями от 26.06.23 №295), предъявляемым к диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D 110117 – Хирургия.

**Рецензент: Член-корр. НАНТ, д.м.н., профессор
ГУ «Институт гастроэнтерологии МЗ
и СЗН Республики Таджикистан»**

 **Ахмадзода С.М.**

Адрес: Республика Таджикистан
г. Душанбе, район Сино,
улица Испечак -2, зд. 20, кв.1
Тел: (+992) 918625126
E-mail: gkbsmp2004@mail.ru

**Подпись Член-корра НАНТ, д.м.н.,
профессора Ахмадзода С.М. заверяю,
начальник отдела кадров ГУ «Институт
гастроэнтерологии МЗ и СЗН РТ»**

 **Ниязов А.**

734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Маяковского 2
ГУ Институт гастроэнтерологии МЗ и СЗН РТ, , E-mail: gastrotj@yandex.ru

«19» 03 2026г.