

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации докторанта PhD кафедры хирургических болезней №2 имени академика Усманова Н.У. ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино» Хамидова Фаридуна Маъруфовича на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц мужского пола», на соискание ученой степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D110117 – Хирургия.

Хирургическое лечения паховых грыж до сегодняшнего дня сохраняет важное практическое и экономическое значение. По статистическим данным грыжесечения составляет от 8 до 24% всех хирургических вмешательств.

Герниология вооружена точными анатомическими данными и богатым практическим опытом. Изучение этио-патогенетических факторов, большого количества методов оперативного вмешательства и их критического анализа не исчерпывают проблему и не снижают его актуальности. Рецидивы паховых грыж отмечаются практически у каждого 8-10 больного, перенесённого оперативное вмешательство. Вследствие распространенности заболевания паховое грыжесечение является одной из первых оперативных вмешательств начинающего хирурга. Однако данный шаг важен и паховое грыжесечение не относится к разряду простых.


Многочисленные оперативные вмешательства по поводу паховых грыж при неумелом, травматичном оперировании может привести к опасности пересечения нервов, повреждения крупных сосудов, органов брюшной полости, мочевого пузыря, элементов семенного канатика, а также к пересечению семявыносящего протока с дальнейшим развитием вторичного мужского бесплодия. Также после этих оперативных вмешательств могут сопровождаться длительные боли в области послеоперационного рубца с снижением трудоспособности больных. В некоторых случаях приводя к повторному оперативному вмешательству.

Другой не менее важной особенностью паховых грыж является то, что в ряде случаев отмечается сочетание паховой грыжи с крипторхизмом, а это патология является основным фактором развития мужского бесплодия.


Таким образом, представленные на автореферате результаты свидетельствуют о том, что в работе применены современные способы хирургического лечения паховых грыж с помощью оптического увеличения и прецизионной техники, и были достигнуты успехи как в научном, так и в практическом плане улучшающие хирургическое лечение первичных, рецидивных паховых грыж и сочетания их с крипторхизмом.

Представленное исследование Хамидова Ф.М. на тему «Оптимизация хирургической тактики паховых грыж у лиц мужского пола», является законченной научно-квалифицированной работой, положения которой содержат решение поставленных задач. Всё вышеуказанное позволяет заключить, что диссертационная работа соответствует требованиям раздела 3 п. 31, 33, 34 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267(с изменениями и дополнениями от 26.06.23 №295), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора философии (PhD), а её автор заслуживает присвоения искомой учёной степени доктора философии (PhD)– доктора по специальности 6D110117 - Хирургия.

Заведующий кафедры
Хирургических болезней и эндохирургии
ГОУ «ИПОВСЗРТ», к.м.н., доцент


Болтуев К.Х.

Подпись Болтуева К.Х. заверяю,
начальник отдела кадров ГОУ «ИПОВСЗРТ»


Хафизова Ф.А.

Адрес: Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект И. Сомони 59
Тел: +992(37)2503101
E-mail: gou@ipovszrt.tj;
Официальный сайт: http. ipovszrt. tj

«18» марта 2026г.

Адрес: Республика Таджикистан, г. Душанбе
Тел.: (+992) 934535577
Email: dr. komron.huseynovich@gmail.com